

Unterarten von *Anthyllis vulneraria* in Baden-Württemberg

	<i>subsp. polyphylla</i>	<i>subsp. alpestris</i>	<i>subsp. carpatica</i>	<i>subsp. pseudovulneraria</i>
Grundblätter	gefiedert	nur Endblättchen	gefiedert	gefiedert
Stängelblätter	3-7, gleichmäßig am Stängel verteilt	0-3, bis zur Stängelmitte	2-3, mit 2-4 Fiederpaaren, im unteren Teil des Stängels zusammengedrängt	3-6, mit 3-6 Fiederpaaren, bis zur Stängelmitte
Endblättchen der oberen Stängelblätter	nicht vergrößert	deutlich vergrößert	deutlich vergrößert	deutlich vergrößert
Stängel	Verzweigt	Einfach	Einfach	Einfach
Kelchhaare	weiß, anliegend oder abstehend	weiß bis grau, abstehend	blass gelblich, anliegend	blass gelblich, anliegend
Blütenfarbe	gelb oder rot	goldgelb	hellgelb	goldgelb
Verbreitung	Gepflanzt oder verwildert	SW-Alb	Tiefere Lagen, in Halbtrockenrasen	In ganz Baden-Württemberg, häufigste Unterart

Zusammengestellt von Arno Wörz im März 2011