

Conyza in Baden-Württemberg

	<i>Conyza canadensis</i> (L.) CRONQUIST (= <i>Erigeron canadensis</i>)	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) CRONQUIST (= <i>Erigeron bonariensis</i>)	<i>Conyza albida</i> WILLD. ex SPRENG. (= <i>Erigeron sumatrensis</i>)
Stängel	zerstreut abstehend behaart	dicht behaart	dicht abstehend behaart
untere Stängelblätter	lanzettlich, entfernt bezahnt, rosettig gehäuft	lanzettlich, entfernt bezahnt, rosettig gehäuft	lanzettlich, entfernt bezahnt
Stängelblätter	frischgrün, auf der Fläche fast kahl, am Rand lang abstehend bewimpert , ganzrandig bis entfernt gezähnt, schmal linealisch	graugrün, dicht kurz anliegend behaart, ganzrandig, schmal linealisch	dicht grau behaart, entfernt bezahnt, lanzettlich
Blütenköpfe	< 1 cm breit, Randblüten mit ca. 1 mm langer Zunge, Hüllblätter 3-4 mm lang, rein grün	>1 cm breit, Randblüten ohne oder mit sehr kurzer Zunge Hüllblätter 4-6 mm lang, meist behaart und mit rötlicher Spitze	>1 cm breit, Randblüten ohne oder mit sehr kurzer Zunge Hüllblätter meist rein grün
Blütenstand	schmal-pyramidal, Endblüte nicht von Seitenästen überragt 100-6000 Blütenköpfchen	schirmförmig, Endblüte oft von Seitenästen überragt 10-15 Blütenköpfchen	pyramidal, Endblüte nicht von Seitenästen überragt > 20 Blütenköpfchen
Größe	20-150 cm	20-75 cm	bis 150 cm
Standort	trockene Ruderalflächen	trockene Ruderalflächen	Äcker und kurzlebige Unkrautfluren
Verbreitung	Eingebürgert aus Nordamerika, weit verbreitet	Neophyt aus Südamerika, selten	Neophyt, selten

Literatur:

- BUTTLER, K.P. (2007): *Erigeron sumatrensis*, das Sumatra-Berufkraut, in Frankfurt am Main. Botanik und Naturschutz in Hessen 20: 89-96
- FISCHER, M, OSWALD, K., ADLER, W. (2008): Exkursionsflora für Österreich Liechtenstein Südtirol. 3. Auflage ROTHMALER (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland Bd.4, 10. Auflage
- SEBALD, O., SEYBOLD, S., PHILIPPI, G., WÖRZ, A. (1996): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs Bd. 6 www.floraweb.de

Zusammengestellt von Anette Rosenbauer im März 2011