

**In Baden-Württemberg**  
**häufige kleinblütige Epilobien**

	<b>parviflorum</b>	<b>collinum</b>	<b>montanum</b>	<b>lanceolatum</b>	<b>palustre</b>
<b>Narbe</b>	vierspaltig	vierspaltig	vierspaltig	vierspaltig	keulenförmig
<b>Stängelquerschnitt</b>	rund	rund	rund	rund	rund
<b>Stängelbehaarung</b>	<b>abstehend</b>	anliegend	anliegend, oben drüsig	anliegend	kahl, manchmal <b>2 Haarreihen</b>
<b>Blattstiel</b>	sitzend	< 3 mm	< 3 mm	<b>4 - 8 mm</b>	sitzend
<b>Blattgrund</b>	vershmälert - herzförmig sitzend	<b>keilförmig</b>	<b>abgerundet</b>	keilförmig	vershmälert - keilförmig sitzend
<b>Knospen</b>	aufrecht	nickend	nickend	nickend	etwas nickend
<b>Frucht</b>	mit langen drüsigen und kurzen drüsen- losen Haaren	<b>drüsenlos</b>	<b>drüsenhaarig</b>	grauhaarig mit kurzen Drüsenhaaren	verkahlend
<b>Verbreitung</b>	überall	Schwarzwald	überall	selten	weit verbreitet
<b>Standort</b>	nass, ruderal	ruderal, kalkmeidend	eutroph	kalkmeidend	nass, kalkmeidend

	<b>roseum</b>	<b>ciliatum</b>	<b>obscurum</b>	<b>tetragonum</b>	<b>t. ssp. lamyi</b>
<b>Narbe</b>	keulenförmig	keulenförmig	keulenförmig	keulenförmig	keulenförmig
<b>Stängelquerschnitt</b>	kantig	kantig	kantig	kantig	kantig
<b>Stängelbehaarung</b>	drüsig	drüsig	anliegend	anliegend	anliegend
<b>Blattstiel</b>	<b>5 - 20 mm</b>	< 3 mm	< 3 mm	<b>sitzend</b>	<b>&lt; 3 mm</b>
<b>Blattgrund</b>	vershmälert	abgerundet	abgerundet	<b>etwas herablaufend</b>	<b>nicht herablaufend</b>
<b>Knospen</b>	nickend	<b>aufrecht</b>	nickend	aufrecht	aufrecht
<b>Frucht</b>	drüsig	<b>drüsig</b>	drüsig	drüsenlos, angedrückt	drüsenlos
<b>Verbreitung</b>	überall	weit verbreitet	Schwarzwald, Bodensee	weit verbreitet	weit verbreitet
<b>Standort</b>	nass, ruderal	ruderal	nass	nass, ruderal	ruderal

Zusammengestellt von Anette Rosenbauer im Juli 2010